



Fiche territoriale de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais

Cette fiche territoriale dresse le bilan et l'évolution des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des polluants atmosphériques de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).

Les chiffres présentés ici sont issus de la 6^{ème} version de l'inventaire BASEMIS[®] développé par Air Pays de la Loire et publié en 2018. Cet inventaire annuel traite des principaux polluants atmosphériques SO₂, NO_x, PM₁₀, PM_{2.5}, NH₃, COVNM, des émissions de GES réglementés par le protocole de Kyoto (CO₂, CH₄, N₂O et gaz fluorés), des consommations d'énergie et des productions d'énergie sur toute la région des Pays de la Loire avec une résolution à la commune, un détail sectoriel et par usage. BASEMIS[®] est un inventaire orienté source, ce qui signifie que les émissions sont comptabilisées au niveau du territoire où elles sont produites.

Les résultats BASEMIS[®] sont reportés conformément au format PCAET imposé par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l'arrêté du 4 août 2016.

CARACTÉRISTIQUES TERRITORIALES - 2018



Répartition de la population dans le zonage (en nombre d'habitants)

- 118-369
- 369-617
- 617-906
- 906-1202
- 1202-2733

La liste des communes [1-27] est détaillée à la fin de ce document

Territoire	Nombre d'habitants	% de la population régionale	Superficie (km ²)	Nombre de communes	Nombre de logements	% des logements régionaux
EPCI	18919	0,5	530	27	9707	0,5
Mayenne	307750	8,2	5214	242	142631	7,5
Pays de la Loire	3772848	100,0	32408	1238	1893811	100,0

Source : INSEE, Population 2018

Les contours utilisés sont ceux des EPCI au 1^{er} janvier 2020.

DONNÉES DE CONTEXTE - 2018


Les données de contexte utilisées dans l'inventaire sont issues de plusieurs sources de données, qui ont été retravaillées afin de correspondre aux années et secteurs considérés dans l'inventaire.

Pour le secteur résidentiel, les calculs ont été effectués à partir de la base logements 2016 de l'INSEE. Cette base de données a été consolidée avec les données Sit@del2 afin d'intégrer les logements construits entre 2008 et 2018.

Pour le secteur tertiaire, les effectifs salariés proviennent des bases ACOSS de l'URSSAF et CLAP de l'INSEE, et le nombre d'élèves de l'Académie de Nantes.


Pour le secteur agricole, les données de cheptel et de surfaces de cultures sont obtenues en croisant les données communales du recensement agricole 2010 et les statistiques agricoles annuelles départementales publiées par le Ministère de l'Agriculture.

Répartition des logements par période de construction




Effectifs tertiaire par branche

Total des effectifs par branche de l'EPCI et parts correspondantes de l'EPCI et du département par rapport à la région.




Répartition des logements par typologie



Cheptels par type d'élevage


Total des cheptels de l'EPCI et parts correspondantes de l'EPCI et du département par rapport à la région.



Surfaces de cultures par type de culture (hors surfaces toujours en herbe)

En 2018, le territoire a une SAU de 34586 ha dont 69 % de superficie toujours en herbe.

La SAU du département est de 303 116 ha et celle de la région 1 631 937 ha.




CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

En 2018, 581 GWh ont été consommés sur le territoire (soit environ 0,6 % des consommations d'énergie finale en région Pays de la Loire).


Le secteur Industrie est le principal poste de consommation énergétique sur le territoire. Le chaleur issue de réseau constitue l'énergie la plus consommée dans ce secteur.

Au niveau régional, les deux principaux secteurs consommateurs sont le transport routier et le résidentiel. Les produits pétroliers et autres (charbon, déchets, ...) constituent l'énergie la plus consommée.


Répartition des consommations d'énergie finale par secteur en 2018



EPCI
30,7 MWh/hab.




Mayenne
31,4 MWh/hab.



Pays de la Loire
24,3 MWh/hab.

Consommations d'énergie finale par type et par secteur en 2018 (en GWh)




Méthodologie


Les consommations d'énergie sont détaillées suivant les types d'énergie suivants : électricité, chaleur issue des réseaux, bois-énergie, autres énergies renouvelables (EnR), gaz naturel et produits pétroliers et autres combustibles (déchets, charbon, ...). Les données sont fournies à climat réel, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas corrigées des variations climatiques. Les consommations d'énergie sont dites finales car elles correspondent à la consommation des utilisateurs finaux, effectivement consommée (essence à la pompe, ..). Par convention, les établissements de production et de distribution d'énergie ne sont pas pris en compte dans les données de consommations.

Pour plus de détails, consulter le guide méthodologique BASEMIS (lien en dernière page).

Répartition des consommations d'énergie finale par secteur et par type en 2018



Évolution des consommations d'énergie finale entre 2008 et 2018




PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE


En 2018, la production d'énergie renouvelable du territoire s'élève à 155 GWh d'énergie primaire valorisée sous forme de : Bois-énergie Biocarburants Eolien terrestre Hydraulique Méthanisation Pompes à chaleur Solaire photovoltaïque Solaire thermique Valorisation des déchets

Cette production s'élève à 11,4 TWh au niveau régional et à 1,3 TWh au niveau départemental.

Énergie renouvelable produite et valorisée sur le territoire (énergie primaire)




Production d'électricité renouvelable du territoire en 2018



Total : 22 GWh

Production de chaleur renouvelable du territoire en 2018



Total : 86 GWh

Méthodologie

Le bilan de production d'énergie renouvelable intègre les filières solaire photovoltaïque, éolien terrestre, hydraulique, géothermie, pompes à chaleur, solaire thermique, bois-énergie, méthanisation et valorisation énergétique des déchets.

Les données proviennent de différentes références bibliographiques : Enedis, RTE, Open-data Réseaux Energies (ODRE), Atlanbois, la base SINOE de l'ADEME, les déclarations des établissements, les données de production nationales ou régionales du SDeS, le fond chaleur de l'ADEME, et la répartition des certificats d'économie d'énergie (CEE) par département et période.

Pour plus de détail, consulter le guide méthodologique BASEMIS (lien en dernière page).

Part de l'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale du territoire en 2018


27 %

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)


En 2018, les émissions de gaz à effet de serre du territoire s'élèvent à 383 kilo tonnes équivalent CO₂ (soit 1% des émissions régionales de GES). Le secteur Agriculture constitue le premier secteur émetteur sur le territoire, suivi par le secteur Industrie hors branche énergie et le secteur Transport routier.

Au niveau régional, les principaux émetteurs sont les secteurs Agriculture, Transport routier.


Contribution des secteurs aux émissions de GES en 2018



EPCI
20,3 teqCO₂/hab.




Mayenne
16 teqCO₂/hab.



Pays de la Loire
7,6 teqCO₂/hab.


Émissions de GES par type et par secteur en 2018 (en kteqCO₂)




Méthodologie

En plus des émissions comptabilisées au niveau du territoire où elles sont produites (SCOPE 1), sont également prises en compte les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité et de chaleur nécessaires aux activités du territoire (SCOPE 2). Afin de déterminer l'impact relatif de chacun des polluants sur le changement climatique, les émissions sont fournies en pouvoir de réchauffement global (PRG). Il est exprimé en équivalence CO₂ d'après les valeurs suivantes : CO₂=1, CH₄=28 et N₂O=265, indiqués dans le 5^{ème} rapport du GIEC (2013). En conformité avec le décret relatif au PCAET, les émissions directes liées aux installations de production d'électricité et de chaleur sont comptabilisées en tant que CO₂ indirect au stade de la consommation. Par convention, les émissions de CO₂ biomasse ne sont quant à elles pas intégrées dans le pouvoir de réchauffement global (PRG) total en teqCO₂. Pour plus de détails, consulter le guide méthodologique BASEMIS (lien en dernière page).

Répartition des émissions de GES en fonction du combustible en 2018




Évolution des émissions de GES entre 2008 et 2018



PUITS DE CARBONE

Le secteur Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (UTCFC) n'est par convention pas intégré dans le total des émissions de GES d'un territoire. Celui-ci ne peut être sommé aux émissions de GES présentées précédemment. Ce secteur génère à la fois des émissions et des absorptions de CO₂. Il permet d'estimer les puits de carbone sur un territoire à travers trois flux : l'accroissement forestier (absorptions), la récolte de bois (émissions), et les changements d'utilisation des sols (émissions et absorptions).

En 2018, le secteur UTCFC du territoire représente -4 kteqCO₂ (les Pays de la Loire représentent, la même année, -2658kteqCO₂)



Méthodologie

La méthodologie appliquée pour l'estimation de ce secteur s'inspire de la méthodologie utilisée pour l'inventaire national élaboré par le CITEPA.


Les émissions et absorptions de CO₂ de ce sous-secteur correspondent à des flux et non des stocks.

Les données proviennent de différentes références bibliographiques : CITEPA, GIEC, INRA, inventaire forestier national (IGN), AGRESTE, Atlanbois, DRAAF.

Pour plus de détail, consulter le guide méthodologique BASEMIS (lien en dernière page).

ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

Évolution des émissions de polluants entre 2008 et 2018 (base 100 en 2008)




Émissions de polluants atmosphériques par habitant en 2018

Territoire	SO2	NOx	PM10	PM2.5	NH3	COVNM
% émissions EPCI/DEP	4%	5,6%	9,1%	8,7%	13,8%	6,3%
EPCI (kg/hab)	1,2	15,3	12,3	4,8	94,9	9,7
Mayenne (kg/hab)	1,8	16,8	8,3	3,4	42,3	9,5
Pays de la Loire (kg/hab)	1,9	12,7	4,4	2,1	16,2	8,3


ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

Les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire s'élevaient en 2018 à 22 tonnes pour le dioxyde de soufre (SO₂), 290 tonnes pour les oxydes d'azote (NO_x), 232 tonnes pour les particules fines avec un diamètre inférieur à 10µm (PM₁₀), 91 tonnes pour les particules fines avec un diamètre inférieur à 2,5µm (PM_{2,5}), 1795 tonnes pour l'ammoniac (NH₃) et 184 tonnes pour les Composés Organiques Volatils Non Méthanique (COVNM). La part d'émissions de chaque secteur d'activité sur le territoire varie en fonction du polluant considéré.

Émissions de polluants par secteur d'activité en 2018



Répartition des émissions de polluants en fonction du combustible en 2018



Méthodologie

Les polluants pris en compte dans l'arrêté relatif au plan climat-air-énergie territorial du 28 juin 2016 sont les suivants : le dioxyde de soufre (SO₂), les oxydes d'azote (NO_x), les particules fines (PM₁₀, PM_{2,5}), l'ammoniac (NH₃) et les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).

Ces polluants sont issus de diverses sources et impactent aussi bien l'environnement (pluies acides, contribution indirecte au réchauffement climatique) que la santé (troubles respiratoires, cardio-vasculaires et effets cancérigènes).

Comme pour les émissions de GES, les émissions de polluants sont comptabilisées où elles sont produites en kilogrammes.

Pour plus de détails consulter le guide méthodologique BASEMIS (lien en dernière page).

Liste des communes

Numéro sur la carte	Code INSEE	Nom de la commune
1	53132	Levaré
2	53234	Saint-Loup-du-Gast
3	53055	Chantrigné
4	53237	Saint-Mars-sur-Colmont
5	53238	Saint-Mars-sur-la-Futaie
6	53131	Lesbois
7	53100	Fougerolles-du-Plessis
8	53125	Landivy
9	53091	Désertines
10	53115	Hercé
11	53170	Oisseau
12	53107	Gorron
13	53213	Saint-Ellier-du-Maine
14	53202	Saint-Berthevin-la-Tannière
15	53176	Le Pas
16	53042	Brecé
17	53154	Montaudin
18	53064	Châtillon-sur-Colmont
19	53071	Colombiers-du-Plessis
20	53047	Careilles
21	53003	Ambrières-les-Vallées
22	53181	Pontmain
23	53079	Couesmes-Vaucé
24	53261	Soucé
25	53270	Vieuvy
26	53093	La Dorée
27	53199	Saint-Aubin-Fosse-Louvain

Les contours utilisés sont ceux des EPCI au 1^{er} janvier 2020.

Pour plus d'informations

Rapport BASEMIS®

Les chiffres départementaux et régionaux ainsi que le guide méthodologique sont disponibles sur le site : <http://www.airpl.org/>

Les partenaires

Observatoire ligérien de la transition énergétique et écologique : <https://teo-paysdelaloire.fr/>

Air Pays de la Loire : <http://www.airpl.org/>

DREAL Pays de la Loire : <http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/>

ADEME Pays de la Loire : <http://www.paysdelaloire.ademe.fr/>

Région Pays de la Loire : <http://www.paysdelaloire.fr/>

ENEDIS : <http://www.enedis.fr/>

GRDF : <http://www.grdf.fr/>

RTE : <http://www.rte-france.com/>

GRTgaz : <http://www.grtgaz.com/>

Contacts

contact@teo-paysdelaloire.fr - 07.88.31.75.34 contact@airpl.org - 02.28.22.02.02

BASEMIS® est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> ou envoyez un courrier à Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

