



Fiche territoriale de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs

Cette fiche territoriale dresse le bilan et l'évolution des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des polluants atmosphériques de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).


Les chiffres présentés ici sont issus de la 6^{ème} version de l'inventaire BASEMIS[®] développé par Air Pays de la Loire et publié en 2018. Cet inventaire annuel traite des principaux polluants atmosphériques SO₂, NO_x, PM₁₀, PM_{2.5}, NH₃, COVNM, des émissions de GES réglementés par le protocole de Kyoto (CO₂, CH₄, N₂O et gaz fluorés), des consommations d'énergie et des productions d'énergie sur toute la région des Pays de la Loire avec une résolution à la commune, un détail sectoriel et par usage. BASEMIS[®] est un inventaire orienté source, ce qui signifie que les émissions sont comptabilisées au niveau du territoire où elles sont produites.

Les résultats BASEMIS[®] sont reportés conformément au format PCAET imposé par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l'arrêté du 4 août 2016.

CARACTÉRISTIQUES TERRITORIALES - 2018



Répartition de la population dans le zonage
(en nombre d'habitants)



La liste des communes [1-26] est détaillée à la fin de ce document

Territoire	Nombre d'habitants	% de la population régionale	Superficie (km ²)	Nombre de communes	Nombre de logements	% des logements régionaux
EPCI	16235	0,4	548	26	8912	0,5
Mayenne	307750	8,2	5214	242	142631	7,5
Pays de la Loire	3772848	100,0	32408	1238	1893811	100,0

Source : INSEE, Population 2018

Les contours utilisés sont ceux des EPCI au 1^{er} janvier 2020.

DONNÉES DE CONTEXTE - 2018


Les données de contexte utilisées dans l'inventaire sont issues de plusieurs sources de données, qui ont été retravaillées afin de correspondre aux années et secteurs considérés dans l'inventaire.

Pour le secteur résidentiel, les calculs ont été effectués à partir de la base logements 2016 de l'INSEE. Cette base de données a été consolidée avec les données Sit@del2 afin d'intégrer les logements construits entre 2008 et 2018.

Pour le secteur tertiaire, les effectifs salariés proviennent des bases ACOSS de l'URSSAF et CLAP de l'INSEE, et le nombre d'élèves de l'Académie de Nantes.


Pour le secteur agricole, les données de cheptel et de surfaces de cultures sont obtenues en croisant les données communales du recensement agricole 2010 et les statistiques agricoles annuelles départementales publiées par le Ministère de l'Agriculture.

Répartition des logements par période de construction




Effectifs tertiaire par branche

Total des effectifs par branche de l'EPCI et parts correspondantes de l'EPCI et du département par rapport à la région.




Répartition des logements par typologie



Cheptels par type d'élevage


Total des cheptels de l'EPCI et parts correspondantes de l'EPCI et du département par rapport à la région.



Surfaces de cultures par type de culture (hors surfaces toujours en herbe)

En 2018, le territoire a une SAU de 25627 ha dont 51 % de superficie toujours en herbe.

La SAU du département est de 303 116 ha et celle de la région 1 631 937 ha.




CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

En 2018, 444 GWh ont été consommés sur le territoire (soit environ 0,5 % des consommations d'énergie finale en région Pays de la Loire).


Le secteur Transport routier est le principal poste de consommation énergétique sur le territoire. Les produits pétroliers et autres (charbon, déchets,...) constituent l'énergie la plus consommée dans ce secteur.

Au niveau régional, les deux principaux secteurs consommateurs sont le transport routier et le résidentiel. Les produits pétroliers et autres (charbon, déchets, ...) constituent l'énergie la plus consommée.


Répartition des consommations d'énergie finale par secteur en 2018



EPCI
27,4 MWh/hab.




Mayenne
31,4 MWh/hab.



Pays de la Loire
24,3 MWh/hab.

Consommations d'énergie finale par type et par secteur en 2018 (en GWh)




Méthodologie


Les consommations d'énergie sont détaillées suivant les types d'énergie suivants : électricité, chaleur issue des réseaux, bois-énergie, autres énergies renouvelables (EnR), gaz naturel et produits pétroliers et autres combustibles (déchets, charbon, ...). Les données sont fournies à climat réel, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas corrigées des variations climatiques. Les consommations d'énergie sont dites finales car elles correspondent à la consommation des utilisateurs finaux, effectivement consommée (essence à la pompe, ..). Par convention, les établissements de production et de distribution d'énergie ne sont pas pris en compte dans les données de consommations.

Pour plus de détails, consulter le guide méthodologique BASEMIS (lien en dernière page).

Répartition des consommations d'énergie finale par secteur et par type en 2018




Évolution des consommations d'énergie finale entre 2008 et 2018




PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE

En 2018, la production d'énergie renouvelable du territoire s'élève à 133 GWh d'énergie primaire valorisée sous forme de : Bois-énergie Biocarburants Eolien terrestre Pompes à chaleur Solaire photovoltaïque Solaire thermique
 Cette production s'élève à 11,4 TWh au niveau régional et à 1,3 TWh au niveau départemental.

Énergie renouvelable produite et valorisée sur le territoire (énergie primaire)




Production d'électricité renouvelable du territoire en 2018



Total : 90 GWh

Production de chaleur renouvelable du territoire en 2018



Total : 24 GWh

Méthodologie

Le bilan de production d'énergie renouvelable intègre les filières solaire photovoltaïque, éolien terrestre, hydraulique, géothermie, pompes à chaleur, solaire thermique, bois-énergie, méthanisation et valorisation énergétique des déchets.

Les données proviennent de différentes références bibliographiques : Enedis, RTE, Open-data Réseaux Energies (ODRE), Atlanbois, la base SINOE de l'ADEME, les déclarations des établissements, les données de production nationales ou régionales du SDeS, le fond chaleur de l'ADEME, et la répartition des certificats d'économie d'énergie (CEE) par département et période.

Pour plus de détail, consulter le guide méthodologique BASEMIS (lien en dernière page).

Part de l'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale du territoire en 2018


30 %

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)


En 2018, les émissions de gaz à effet de serre du territoire s'élèvent à 251 kilo tonnes équivalent CO₂ (soit 0,9% des émissions régionales de GES). Le secteur Agriculture constitue le premier secteur émetteur sur le territoire, suivi par le secteur Transport routier et le secteur Industrie hors branche énergie.

Au niveau régional, les principaux émetteurs sont les secteurs Agriculture, Transport routier.


Contribution des secteurs aux émissions de GES en 2018



EPCI
15,5 teqCO₂/hab.




Mayenne
16 teqCO₂/hab.



Pays de la Loire
7,6 teqCO₂/hab.


Émissions de GES par type et par secteur en 2018 (en kteqCO₂)




Méthodologie

En plus des émissions comptabilisées au niveau du territoire où elles sont produites (SCOPE 1), sont également prises en compte les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité et de chaleur nécessaires aux activités du territoire (SCOPE 2). Afin de déterminer l'impact relatif de chacun des polluants sur le changement climatique, les émissions sont fournies en pouvoir de réchauffement global (PRG). Il est exprimé en équivalence CO₂ d'après les valeurs suivantes : CO₂=1, CH₄=28 et N₂O=265, indiqués dans le 5^{ème} rapport du GIEC (2013). En conformité avec le décret relatif au PCAET, les émissions directes liées aux installations de production d'électricité et de chaleur sont comptabilisées en tant que CO₂ indirect au stade de la consommation. Par convention, les émissions de CO₂ biomasse ne sont quant à elles pas intégrées dans le pouvoir de réchauffement global (PRG) total en teqCO₂. Pour plus de détails, consulter le guide méthodologique BASEMIS (lien en dernière page).

Répartition des émissions de GES en fonction du combustible en 2018




Évolution des émissions de GES entre 2008 et 2018



PUITS DE CARBONE

Le secteur Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (UTCf) n'est par convention pas intégré dans le total des émissions de GES d'un territoire. Celui-ci ne peut être sommé aux émissions de GES présentées précédemment. Ce secteur génère à la fois des émissions et des absorptions de CO₂. Il permet d'estimer les puits de carbone sur un territoire à travers trois flux : l'accroissement forestier (absorptions), la récolte de bois (émissions), et les changements d'utilisation des sols (émissions et absorptions).

En 2018, le secteur UTCf du territoire représente -80 kteqCO₂ (les Pays de la Loire représentent, la même année, -2658kteqCO₂)



Méthodologie

La méthodologie appliquée pour l'estimation de ce secteur s'inspire de la méthodologie utilisée pour l'inventaire national élaboré par le CITEPA.


Les émissions et absorptions de CO₂ de ce sous-secteur correspondent à des flux et non des stocks.

Les données proviennent de différentes références bibliographiques : CITEPA, GIEC, INRA, inventaire forestier national (IGN), AGRESTE, Atlanbois, DRAAF.

Pour plus de détail, consulter le guide méthodologique BASEMIS (lien en dernière page).

ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

Évolution des émissions de polluants entre 2008 et 2018 (base 100 en 2008)




Émissions de polluants atmosphériques par habitant en 2018

Territoire	SO ₂	NO _x	PM ₁₀	PM _{2.5}	NH ₃	COVNM
% émissions EPCI/DEP	14%	4,8%	10,7%	11,6%	8%	4,3%
EPCI (kg/hab)	4,7	15,3	16,9	7,5	63,6	7,8
Mayenne (kg/hab)	1,8	16,8	8,3	3,4	42,3	9,5
Pays de la Loire (kg/hab)	1,9	12,7	4,4	2,1	16,2	8,3


ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

Les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire s'élèvent en 2018 à 77 tonnes pour le dioxyde de soufre (SO₂), 248 tonnes pour les oxydes d'azote (NO_x), 274 tonnes pour les particules fines avec un diamètre inférieur à 10µm (PM₁₀), 121 tonnes pour les particules fines avec un diamètre inférieur à 2,5µm (PM_{2,5}), 1033 tonnes pour l'ammoniac (NH₃) et 127 tonnes pour les Composés Organiques Volatils Non Méthanique (COVNM). La part d'émissions de chaque secteur d'activité sur le territoire varie en fonction du polluant considéré.

Émissions de polluants par secteur d'activité en 2018



Répartition des émissions de polluants en fonction du combustible en 2018



Méthodologie

Les polluants pris en compte dans l'arrêté relatif au plan climat-air-énergie territorial du 28 juin 2016 sont les suivants : le dioxyde de soufre (SO₂), les oxydes d'azote (NO_x), les particules fines (PM₁₀, PM_{2,5}), l'ammoniac (NH₃) et les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).

Ces polluants sont issus de diverses sources et impactent aussi bien l'environnement (pluies acides, contribution indirecte au réchauffement climatique) que la santé (troubles respiratoires, cardio-vasculaires et effets cancérigènes).

Comme pour les émissions de GES, les émissions de polluants sont comptabilisées où elles sont produites en kilogrammes.

Pour plus de détails consulter le guide méthodologique BASEMIS (lien en dernière page).

Liste des communes

Numéro sur la carte	Code INSEE	Nom de la commune
1	53236	Saint-Mars-du-Désert
2	53112	Le Ham
3	53173	La Pallu
4	53142	Madré
5	53038	Boulay-les-Ifs
6	53198	Saint-Aubin-du-Désert
7	53139	Loupfougères
8	53185	Pré-en-Pail-Saint-Samson
9	53187	Ravigny
10	53246	Saint-Pierre-des-Nids
11	53085	Crennes-sur-Fraubée
12	53271	Villaines-la-Juhel
13	53272	Villepail
14	53052	Champfrémont
15	53106	Gesvres
16	53121	Javron-les-Chapelles
17	53083	Courcité
18	53196	Saint-Aignan-de-Couptrain
19	53164	Neuilly-le-Vendin
20	53133	Lignièrès-Orgères
21	53204	Saint-Calais-du-Désert
22	53013	Averton
23	53080	Couptrain
24	53208	Saint-Cyr-en-Pail
25	53069	Chevaigné-du-Maine
26	53223	Saint-Germain-de-Coulamer

Les contours utilisés sont ceux des EPCI au 1^{er} janvier 2020.

Pour plus d'informations

Rapport BASEMIS®

Les chiffres départementaux et régionaux ainsi que le guide méthodologique sont disponibles sur le site : <http://www.airpl.org/>

Les partenaires

Observatoire ligérien de la transition énergétique et écologique : <https://teo-paysdelaloire.fr/>

Air Pays de la Loire : <http://www.airpl.org/>

DREAL Pays de la Loire : <http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/>

ADEME Pays de la Loire : <http://www.paysdelaloire.ademe.fr/>

Région Pays de la Loire : <http://www.paysdelaloire.fr/>

ENEDIS : <http://www.enedis.fr/>

GRDF : <http://www.grdf.fr/>

RTE : <http://www.rte-france.com/>

GRTgaz : <http://www.grtgaz.com/>

Contacts

contact@teo-paysdelaloire.fr - 07.88.31.75.34 contact@airpl.org - 02.28.22.02.02

BASEMIS® est sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> ou envoyez un courrier à Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.



PROJETEUR ÉCOLOGIQUE COMMUNAUTAIRE
PAYS DE LA LOIRE

